



INDIANA 2018–19 Required and Recommended School Immunizations

To learn more about vaccines, visit vaccinateindiana.org

3 to 5 years old	K – 4 th Grade	Grade 5	Grade 6	Grade 7 to 11	Grade 12
Hepatitis B (HepB) 3					
Diphtheria, Tetanus & Pertussis (DTaP/DT) 4	DTaP/DT 5		Tetanus, Diphtheria & Pertussis (Tdap) 1		
Inactivated Polio (IPV) 3			IPV 4		
Measles, Mumps & Rubella (MMR) 1			MMR 2		
Varicella 1	Varicella 2				
	Hepatitis A (HepA) 2	HepA 2*	HepA 2	HepA 2*	HepA 2
			MCV4 (Meningococcal) 1		MCV4 2
			HPV (Human Papillomavirus) 2*	HPV 2*/3*	
					MenB (Meningococcal) 2 *
Annual Influenza *					

*Recommended vaccines | Number under vaccine denotes the number of cumulative doses needed.

INDIANA 2018–19 Required and Recommended School Immunizations



	REQUIRED	RECOMMENDED
3-5 years old	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Diphtheria, Tetanus & Pertussis) • 3 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Varicella (Chickenpox) • 1 MMR (Measles Mumps & Rubella)
K-4th grade	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicella • 2 Hepatitis A
5th grade	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicella
6th grade	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicella • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (Meningococcal) • 1 Tdap (Tetanus, Diphtheria & Pertussis)
7th-11th grade	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicella • 1 MCV4 (Meningococcal) • 1 Tdap (Tetanus, Diphtheria & Pertussis)
12th grade	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicella • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap

Hep B: The minimum age for the 3rd dose of Hepatitis B is 24 weeks of age.

DTaP: 4 doses of DTaP/DTP/DT are acceptable if 4th dose was administered on or after child's 4th birthday.

Polio: *3 doses of Polio are acceptable for all grade levels if the third dose was given on or after the 4th birthday and at least 6 months after the previous dose with only one type of vaccine used (all OPV or all IPV).

*For students in grades K–8th grade, the final dose must be administered on or after the 4th birthday and be administered at least 6 months after the previous dose.

Varicella: Physician documentation of disease history, including month and year, is proof of immunity for children entering preschool through 10th grade. Parental report of disease history is acceptable for grades 11–12.

Tdap: There is no minimum interval from the last Td dose.

MCV4: Individuals who receive dose 1 after their 16th birthday only need 1 dose of MCV4.

Hep A: The minimum interval between 1st and 2nd dose is 6 calendar months. 2 doses of Hep A is required for grades K–4, 6 and 12.

*For grades 5, and 7–11, 2 doses of Hep A vaccine are recommended.



Number under vaccine denotes the number of cumulative doses needed.



Vacunas escolares requeridas y recomendadas - INDIANA 2018–19

Para obtener más información sobre las vacunas, visite vaccinateindiana.org

3 a 5 años de edad	Kínder a 4to. grado	5to. grado	6to. grado	7mo. a 11vo. grado	12vo. grado
Hepatitis B (HepB) 3					
Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP/DT) 4	DTaP/DT 5		Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap) 1		
Polio inactivada (IPV) 3			IPV 4		
Sarampión, paperas y rubéola (MMR) 1			MMR 2		
Varicela 1	Varicela 2				
	Hepatitis A (HepA) 2	HepA 2*	HepA 2	HepA 2*	HepA 2
			MCV4 (antimeningocócica) 1		MCV4 2
			HPV (Virus del papiloma humano) 2*	HPV 2*/3*	
					MenB (antimeningocócica) 2*
Influenza anual*					

* Vacunas recomendadas | El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

INDIANA 2018–19

Vacunas escolares requeridas y recomendadas



	REQUERIDA		RECOMENDADA
3 a 5 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) • 3 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Varicela • 1 MMR (Sarampión, paperas y rubéola) 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual
Kínder a 4to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicela • 2 Hepatitis A 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual
5to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 Hepatitis A
6to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina) 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 HPV (Virus del papiloma humano)
7mo. a 11vo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina) 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 Hepatitis A • 2/3 HPV
12vo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 MenB (antimeningocócica) • 2/3 HPV

El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

Hep B: La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas.

DTaP: 4 dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4ta. dosis se aplicó el día en que el niño cumplió 4 años de edad o después.

Polio: *3 dosis de polio son aceptables para todos los grados si la tercera dosis se aplicó el día en que el niño cumplió 4 años de edad o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior, y si se usó sólo un tipo de vacuna (todas OPV [orales] o todas IPV [inactivas])

*Para los alumnos en Kínder a 8vo. grado, la dosis final se debe aplicar el día en que el niño cumpla 4 años de edad o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación médica sobre el historial de enfermedades, que incluya mes y año, es prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta el 10mo. grado. La información por parte de los padres sobre el historial de enfermedades es aceptable para 11vo. y 12vo. grados.

Tdap: No existe intervalo mínimo para la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis después de cumplir 16 años de edad sólo necesitan una dosis de MCV4.

Hep A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis de Hep A para Kínder a 4to. grado, 6to. y 12vo. grados.

*Para los grados 5to., y 7mo. a 11vo., se recomiendan 2 dosis de vacuna contra Hep A.



Para obtener más información sobre las vacunas, visite vaccinateindiana.org